



#### Technische Informationen

Karton mit 20 Kittelfl. à 150 ml  
 Karton mit 20 Eurofl. à 500 ml  
 Karton mit 10 Eurofl. à 1.000 ml  
 Karton mit 6 V10-Fl. à 1.000 ml

#### Zubehör

Wandspender für 500 ml Fl.  
 Wandspender für 1.000 ml Eurofl.  
 Handdispenser für 500 ml Eurofl.  
 und 1.000 ml Eurofl.  
 Wandspender für 1.000 ml V10-Fl.  
 Abtropfschale für V10 Wandspender  
 Edelstahlbügel für V10 Wandspender

#### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe:  
 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol.  
 Sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser.  
 Zul.-Nr.: 2546.00.00;  
 Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate.

CimoSept Hände ist in Deutschland als Arzneimittel zugelassen und daher von der Kennzeichnungspflicht nach Gefahrstoffrecht ausgenommen.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung und Beseitigung

Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Bei Anwendung nicht rauchen. Dicht verschlossen und vor Hitze geschützt aufbewahren! Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### Verfallsdatum

CimoSept Hände ist 3 Jahre haltbar. Das Verfallsdatum ist auf der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand der Information: 11/2017

© 0119



#### Alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Lösung zur Anwendung auf der Haut.

##### Anwendungsgebiete

Hygienische Händedesinfektion.

##### Dosierungsanleitung/Art der Anwendung

Hygienische Händedesinfektion: Ca. 3 ml CimoSept Hände auf den Händen verteilen, gut einmassieren und trocknen lassen. Dauer 30 Sek. Bei starker offensichtlicher Kontamination und Kontamination mit Tuberkulose-Bakterien ist die Desinfektion zweimal durchzuführen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek.*	VAH/DGHM, EN 1500
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.*	EN 14348, hohe Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.**	DVV/RKI-Leitlinie
Rotaviren	konz. 15 Sek.**	DVV
Noroviren (Murines Norovirus MNV)	konz. 30 Sek.*	EN 14476, niedrige Belastung
Adenoviren	konz. 30 Sek.*	EN 14476, niedrige Belastung
begrenzt viruzid PLUS (MNV, Adenoviren)	konz. 1 Min.*	EN 14476, niedrige Belastung

\* Die trockenen Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Produkt feucht gehalten werden.

\*\* Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

##### Produkteigenschaften

- VAH-gelistet zur hygienischen Händedesinfektion
- RKI-gelistet: Wirkungsbereich A
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid
- begrenzt viruzid PLUS: wirksam gegen Noro-, Rota- und Adenoviren im Routine- und Ausbruchsfall
- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Enthält rückfettende Hautpflegekomponenten
- Aufgeführt in der IHO Viruzidie-Liste

##### Gegenanzeigen

Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe anwenden.  
 Nicht auf Schleimhäuten anwenden.

##### Wechselwirkungen

Keine bekannt.

##### Nebenwirkungen

Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Austrocknung) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch Kontaktallergien sind möglich. Bei Auftreten von nicht aufgeführten Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

##### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.